

首・肩のつらい痛み

フェイタズ[®] Z_α ローション

微香性

ジクロフェナクナトリウム1.0%配合

商品の特長

- 効きめ成分ジクロフェナクナトリウムが、肩や腰、関節等のつらい痛み優れた効きめをあらわします。
- l*-メントール3.0%配合なので、さわやかな使用感です。
- 持ちやすさと塗りやすさを追求したオリジナルボトル採用なので、手を汚さずに1人でも簡単に肩や首筋に塗布できます。
- 臭いの気にならない微香性なので、周囲の人に気を使わずに使用できます。

⚠️ [使用上の注意]

❌ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

- 次の人は使用しないでください。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4)15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。
 - (3)湿疹、かぶれ、傷口。
 - (4)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。
- 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、 ^{らくせつ} 落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎 光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

【用法・用量】 1日3～4回、適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 1週間あたり、50mLを超えて使用しないでください。
- (6) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (8) 通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。

【成分・含量】

成分	含量(100g中)
ジクロフェナクナトリウム	1g
l-メントール	3g

添加物として、アジピン酸ジイソプロピル、イソプロパノール、乳酸、プロピレングリコール、ポリソルベート80を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ(イソプロパノール、プロピレングリコール)

〈包装〉 50mL

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)