

HapYcom  
ハピコム

# 眼病予防

コンタクトを外した後に

# ロート ビタうるる 洗眼薬 W<sup>+</sup>

**Wビタミン**

ダメージを受けた瞳に  
**Wプラスの処方**

**角膜保護  
成分配合**



**抗炎症  
成分配合**

**もみ洗いで  
しっかり洗眼**



防腐剤\*無添加

第3類医薬品

第3類医薬品

ROHTO

この外箱は、本剤とともに保管し、  
使用の際には、よくお読みください。

販売名：ロートビタうるる洗眼薬W+

## ⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人：眼球乾燥症候群(ドライアイ)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

●その他、目に何らかの異常が感じられた場合

## 効能・効果

目の洗浄、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目にに入ったときなど)

## 用法・用量

添付のアイカップで、1日3～6回、1回5mLを用いて洗眼してください。

\*詳しい使い方は裏面をご覧ください。

## —— 用法・用量に関する注意 ——

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。また、再装着する場合は、洗眼してから10～15分程度あけてください。
- (4) アイカップは使用前後に水道水で十分に洗浄してください。
- (5) 混濁したものは使用しないでください。
- (6) 洗眼用にのみ使用してください。
- (7) 長期連用しないでください。

## 成 分

硫酸亜鉛水和物(抗炎症成分) ..... 0.01%  
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム  
(角膜保護成分) ..... 0.01%  
クロルフェニラミンマレイン酸塩 ..... 0.003%  
ビタミンB<sub>6</sub> ..... 0.01%  
ビタミンB<sub>12</sub> ..... 0.001%  
L-アスパラギン酸カリウム ..... 0.1%  
添加物としてホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、ホウ砂、dl-カンフル、ゲラニオール、l-メントール、ヒアルロン酸Na、pH調節剤を含有する。

\*防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

ダブルのビタミン配合  
瞳をリラックス

ビタミンB6

ビタミンB12

# 下向きだからラクラク洗眼

ほこりや汚れなど瞳のダメージを洗い流す



上向きでも  
洗える!

## 使いやすさを 追求した イージーカップ®

POINT 1

### 吸着フィット してこぼれない!

柔らか素材のカップで目の周りに  
やさしくフィットする


POINT 2

### 汚れをかき出す 対流洗浄!

つまんで起こる対流効果で  
瞳すっきりまる洗い

### 使い方

目のまわりのよごれや化粧をふきとてからご使用ください。



1. そそぐ 本剤をアイカップに5mL(カップの内側の線まで)入れます。
2. フィットさせる 下を向いて、カップを片方の目に押し当ててください。カップの下部(くぼみの下)を数回つまむことでカップが吸いつくようにフィットします。
3. 洗う フィットさせたまま、まばたきを数回繰り返してください。  
※もみ洗いもできます。カップの下部(くぼみの下)を数回つまむと対流が起りより洗眼しやすくなります。
  - 上向きで洗眼する場合は、液がこぼれないように上を向き、そのまま数回まばたきをしてください。
  - あまり長い間(10秒以上)、洗眼しつづけないでください。
4. 反対の目を洗う 液を捨ててカップを洗浄してから、もう片方の目も同様に洗眼してください。  
●片方の目を洗った本剤は、もう片方の目に使用しないでください。
5. カップの洗浄 使用後はカップを十分に洗浄してください。  
●カップに残った水分は清潔なティッシュ等でふき取るか、自然乾燥をおすすめします。



### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)アイカップは他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱・容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の口周辺につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

### お問合せ先 お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020**

**大阪:06-6758-1230**

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

**ロート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1