

# リコリス 「ゼンヤク」 小児用



## 第2類医薬品

〔効能・効果〕幼小児の発育期・偏食  
児・発熱性消耗性疾患・病中病後・  
胃腸障害・栄養障害などの栄養  
補給、虚弱体質、滋養強壮。

製造販売元 **全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15

全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

販売名：リコリス「ゼンヤク」小児用

**使用上の注意** \*本剤は小児用ですが、滋養強壮保健薬として定められた一般的な  
注意事項を記載しています。

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期連用しないこと。

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

〔用法・用量〕3才以上15才未満、1回1びん(20mL)を1日3回服用。

\*小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分〕(1びん20mL中)カンゾウ(甘草)エキス100mg(原生薬換算量500mg)、グルコン酸カルシウム水和物100mg、リボフラビン0.67mg、オロチン酸コリン25mg、タウリン100mg、パンテノール3.33mg

添加物としてアルコール、安息香酸Na、パラベン、カラメル、チンピチンキ、白糖、水アメ、dl-リンゴ酸Naを含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

(1)直射日光のあたらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。(4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意すること。

使用  
期限  
(年.月)  
  
製造  
番号

