

服用に際しては、説明書をよく読んでください。

滋養強壮・栄養補給

# リポビタミンDルイパー

販売名：リポビタミンDK

指定医薬部外品

## 【使用上の注意】

### 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚：発疹／消化器：胃部不快感

(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、

服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

## 【効能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の  
栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

## 【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

## 【注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製剤を同時に  
服用する場合には過剰摂取等に注意してください）

(2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わり  
ありません。よく振ってから服用してください。

## 【成分】 100mL 中

タウリン	3000mg
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	20mg
ローヤルゼリー	100mg
カルニチン塩化物	50mg
チアミン硝酸塩（ビタミンB <sub>1</sub> ）	10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB <sub>2</sub> ）	5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	10mg
イノシトール	100mg
ニコチン酸アミド	20mg
無水カフェイン	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、アセスルファムK、スクラロース、ステビア抽出精製物、  
クエン酸、クエン酸Na、ポビドン、没食子酸プロピル、安息香酸Na、カラメル、  
香料、グリセリン

## 【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>による  
もので、ご心配ありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬株式会社<sup>11</sup>  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
お客様119番室 電話03-3985-1800

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—