

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

かゆみ 肩こりに
キンカン[®]
外用鎮痒鎮痛消炎剤

第2類医薬品

■ 製品の特徴 ■

キンカンは有効成分が複合的に作用して、すばやく患部の熱を奪い去り、局所刺激を与えることにより、かゆみや痛みの伝わりを抑制し、虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫に対して優れた効果を発揮します。

⚠ ■ 使用上の注意 ■

⊗ してはいけないこと〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等
 - かぶれ、傷口
- かぶれる恐れがあるので、ガーゼ等に浸して患部に貼り付けしないでください。



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
 - 皮膚の特に弱い人や乳幼児
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感

- 本品を5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能又は効果 ■

虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫

■ 用法及び用量 ■

1日数回、患部に適量を塗布してください。



<用法・用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。誤って口に入った場合には、水でうがいをしてください。飲み込んでしまった場合には、医師に相談してください。

(裏面もお読みください)

◆使用方法

- ①ご使用前に瓶を上向きにし、スポンジ中央を数回押してください。
中の空気が抜け、液の出過ぎを防ぐことができます。(図1)
- ②患部を清潔な状態(汚れ・化粧品・薬剤等が付着していない状態)にしてください。
- ③スポンジを患部に軽く押しつけ、液をふくませます。(図2)
- ④「塗ってはよく乾かし」を複数回繰り返してください。
※かぶれる恐れがありますので、完全に液が乾くまでは衣服・ガーゼ等で覆わないようにしてください。
※目詰まりすることがあるため、スポンジが汚れたらやさしく拭き取ってください。



■成分及び分量■ (100mL中)

成分	含量
アンモニア水	21.3mL
l-メントール	1.97g
d-カンフル	2.41g
サリチル酸	0.57g
トウガラシチンキ	0.35mL (原生薬量として35mg)

添加物として朝鮮人参抽出液、溶剤としてアルコールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)溶剤としてアルコールを含んでいるため、下記事項に充分注意してください。
 - 暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。
 - 車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。
 - プラスチック類、化繊製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

■消費者相談窓口■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社 金冠堂 お客様相談室 TEL: 03-3421-6171

[受付時間: 9:00 ~ 16:00 月~金(祝日を除く)]

製造販売元 株式会社 金冠堂

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14

<http://www.kinkan.co.jp>