



指定医薬部外品

のどの痛み・はれ・あれ・不快感・声がれに

コルゲン・シュートローチ



- 効能・効果／のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ・のどのあれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- 用法・用量／成人(15歳以上)は、1回1個を1日4～5回、小児(5歳以上15歳未満)は、1回1個を1日2～3回、口の中にかまずにできるだけゆっくり溶かして用いる。

製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

●**使用上の注意**／**相談すること** 1.次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。(3)薬によりアレルギー症状を起したことがある人。2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること(1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

●**用法・用量**／成人(15歳以上)は、1回1個を1日4～5回、小児(5歳以上15歳未満)は、1回1個を1日2～3回、口の中でかまずにできるだけゆっくり溶かして用いる。

〈**用法・用量に関連する注意**〉

(1)用法・用量を厳守すること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)かみ砕いたり、のみ込んだりしないこと。(4)トローチの取り出し方：下図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



●**成分・分量(5個中)**／グリチルリチン酸二カリウム 15.0mg セチルピリジニウム塩化物水和物 5.0mg セネガ乾燥エキス 23.95mg (セネガとして 400mg)

[添加物]ブドウ糖、白糖、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色五号、デキストリン、L-メントール、香料、ステアリン酸 Mg

〈**成分・分量に関連する注意**〉

本剤には生薬が配合されているので、製品により色が多少異なることがある。

●**保管及び取扱い上の注意**／(1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)PTPのアルミ箔が破れたり、中身のトローチが破損しないように、保管及び携帯に注意すること。(5)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

口腔咽喉薬

販売名：新コルゲンコーワトローチ A

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月～金(祝日を除く)9:00～17:00