

あったら
いいな

をカタチにする

小林製薬

成分・分量 100mL中

サリチル酸グリコール 2500mg
L-メントール 3000mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 100mg
ニコチン酸ベンジルエステル 10mg
ノナン酸バニリルアミド 12mg
添加物として、プロピレングリ
コール、エタノール、ハアセチル
しょ糖を含有する

用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)小児に使用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに使用させること(2)目
に入らないように注意すること。万一、目
に入った場合には、すぐに水またはぬるま
湯で洗うこと。なお、症状が重い場合に
は、眼科医の診療を受けること(3)外用に
のみ使用すること●塗布部位をラップ
フィルムなどの通気性の悪いもので覆わ
ないこと●皮膚の特に弱い人は、同じと
ころに続けて使用しないこと●スポーツ
や入浴など、汗をかく前・後に使用した場
合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増
すことがあります。これらの症状が強い
場合は、石けんで洗い流すと緩和します

製品のお問合せは、お買い求めのお店
またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

無臭性



小林製薬

肩こり、筋肉痛に

NEW

アンメルツ®

ヨコヨコA

鎮痛成分+血行促進成分

サリチル酸グリコール

ノナン酸バニリルアミド



イメージ図

第3類医薬品

NEW

アンメルツ

ヨコヨコA

第3類医薬品

効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、打撲、捻挫、関節痛

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
- キャップをしっかりとしめない
と液が漏れることがある
- プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を
過ぎた製品は使用しないこと

販売名:ニューアンメルツヨコヨコA
External Anti-Inflammatory / Analgesic

第3類医薬品

外用消炎鎮痛剤

特徴

- ① 消炎鎮痛成分サリチル酸グリコールが患部に浸透し、肩こり、筋肉痛を治療していきます
- ② 血行促進成分ノナン酸バニリルアミドが、じんじんという温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善し、肩こりや筋肉痛を和らげます
- ③ ニオイが気にならない無臭性です
- ④ 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトルです

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜など (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること