

第2類医薬品

販売名:セナキュア
にきび治療薬 Acne Remedy
効能・効果
にきび

用法・用量

1日2回(朝・晩)、適量を患部に塗布する

<用法・用量に関する注意>

(1) 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用を避けること(2) 定められた用法・用量を厳守すること

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること(4) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うことなお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(5) 外用にのみ使用すること

成分・分量

100g中
サリチル酸 0.5g
エタノール 22.84g
アラントイン 0.2g
添加物として、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、パラベン、エデト酸Na、pH調節剤を含有する

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

第2石油類
危険等級Ⅲ
エタノール含有物
水溶性

火気厳禁

MADE IN JAPAN

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう
大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた
製品は使用しないこと

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
目や目の周囲

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 湿潤やただれのひどい人
(5) 深い傷やひどいやけどの人
(6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. その他

(1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止すること
(2) 本剤の使用により、皮ふが多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止すること。再び使用するときは間隔をあけて使用すること

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにキャップをしっかりとしめて保管すること
(2) 小児の手の届かないところに保管すること
(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●衣服、寝具、家具、床等につかないように十分ご注意ください(材質によっては落ちにくいくことや変色・変質することがある)●残量が少なくなった場合、倒立(逆さ)使用では噴霧しにくくなることがあります。その場合には、正立て空噴きすると噴霧できるようになります

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

「あつらいいな」をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3