

服用に際しては、説明書をよく読んでください。

滋養強壮・栄養補給

# リポビタミンDスーパー

販売名：リポビタミンDスーパー

指定医薬部外品

## 【使用上の注意】

### 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

皮ふ：発疹／消化器：胃部不快感

(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、

服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

## 【効 能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の  
栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

## 【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

## 【注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製剤を同時に  
服用する場合には過剰摂取等に注意してください）

(2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わり  
ありません。よく振ってから服用してください。

## 【成 分】 100mL 中

チアミン硝酸塩（ビタミン B <sub>1</sub> ）	10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B <sub>2</sub> ）	5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B <sub>6</sub> ）	5mg
トコフェロール酢酸エステル（ビタミン E）	10mg
ニコチン酸アミド	20mg
タウリン	2000mg
L-アルギニン塩酸塩	300mg
無水カフェイン	50mg
イノシトール	100mg
ニンジンエキス-P	130mg（ニンジン 910mg に相当）

添加物：白糖、D-ソルビトール、ポビドン、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、  
没食子酸プロピル、安息香酸 Na、pH 調整剤、クエン酸、香料、バニリン

## 【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B<sub>2</sub>による  
もので、ご心配ありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室

電話 03-3985-1800

大正製薬  株式会社<sup>41</sup>  
東京都豊島区高田3丁目24番1号

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—