

ビタミンB₂主薬製剤

△使用上の注意 **相談すること** 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

効能・効果 ●次の諸症状の緩和:肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ、「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
●次の場合のビタミンB₂の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

成分・分量 1本(50mL)中 リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)30mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、ニコチン酸アミド60mg、チアミン硝酸塩(ビタミンB₁硝酸塩)10mg、ヨクイニンエキス150mg(ヨクイニンとして1950mgに相当する)【添加物】エリスリトール、dl-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、スクラロース、アセスルファムK、香料

HapYcom

第3類医薬品

肌あれと疲れに
B₂B₆
にきび・口内炎

リナルBBドリンクライト

ビタミンB₂B₆
ヨクイニンエキス

1.5
kcal

販売名:
リナルBBドリンクライト

用法・用量 成人(15歳以上)
1回1本(50mL)を1日1回
服用してください。

保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、ビタミンB₂リン酸エステルによるものですので心配ありません。

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室: 0595-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

01RBELIO