1日1回型 みずむし・たむし治療外用剤

第2類医薬品

アニベールエースクリーム

製品の特徴

みずむしやたむしは白癬菌というカビの1種が原因となる皮膚病で、一般にたまらないかゆみを伴います。白癬菌は高温多湿を好み、薬剤の浸透しにくい皮膚表面の角質層を棲家とするため根治し難く、再発し易い疾患です。

本剤は、白癬菌などに対して長い時間にわたって殺菌効果を示すビホナ ゾールを配合しているため、通常1日1回の塗布により効果をあらわし、さ らに、たまらないかゆみを抑える4つの成分をプラスした、多忙な現代人の 生活にピッタリの、みずむし・たむし治療剤です。基剤には、サラッとして ベタつきの少ない親水性基剤を採用しています。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと 🔯

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、 外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること



- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)患部が化膿している人。
- (6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」 かがはっきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因 による場合が多い。)

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直 ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に ご相談ください

関係部位			症		状			
	皮膚	発疹・発赤、	かゆみ、	かぶれ、	はれ、	刺激感、	熱感、	た
		だれ、乾燥感	、ヒリヒ	リ感				

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

[効能・効果]

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

[用法・用量]

患部を清潔にして、1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)定められた用法、用量を厳守してください。

[成分・分量] 1g中

成分名	分量	作用等
ビホナゾール	10mg	1日1回で、みずむし菌を殺します。
クロタミトン	50mg	かゆみを持続的に抑えます。
リドカイン	20mg	かゆみ、痛みを即座に抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
ℚ-メントール	20mg	スッとする使用感で、かゆみを軽減します。

添加物:ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、 パラベン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、塩酸 [保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してくだ さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)。
- (4)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、アルコール類や油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床など)への本剤の付着は避けてください。

みずむし治療のポイント

- 1. 清潔 患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。
- 2. 乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良く、よく乾燥。
- 3. 根気 風呂あがりの薬剤治療、痒くなくても1シーズン。

製品のお問い合わせ先 新生薬品株式会社 消費者相談窓口電話:076-472-0361 受付時間:9時~17時(土、日、祝日を除く)

^{発売元} 小林薬品工業株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元 新生薬品株式会社

