

ご使用前に、この箱の説明文をお読みください。  
また必要な時に読めるように保管してください。

平成 25 年 1 月改訂

**第 2 類医薬品**

**コトブキ浣腸 30**

(情報は小箱に直接記載)

**⚠ [使用上の注意]**

**⊗ してはいけないこと**

**連用しないこと** (常用すると、効果が減弱し (いわゆる “なれ” が生じ) 薬剤にたよりがちになる。)



**相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

**2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**その他の注意**

**次の症状があらわれることがある**

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

**[効能・効果]** 便秘

**[用法・用量]**


12歳以上1回1個(30g)を直腸内に注入します。  
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

**<用法・用量に関する注意>**

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。  
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 浣腸にのみ使用すること。
- (5) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (6) 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

## 【使用方法】

- ① 容器先端のキャップを外し、肛門部へなるべく深く挿入します。  
(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- ② 容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- ③ 薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。



[便秘しがちな方のために] (小箱に記載なし)

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけてください。  
また、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行ってください。
2. 繊維質の多い食べ物と水分を多くとるように心がけてください。  
(例：野菜類・果物・コンニャク・カンテン・海藻等)
3. 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけてください。
4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと、便意をもよおしやすくなります。

**【成分・分量】**本品1個(30g)中

日局 グリセリン・・・・・・・・・・ 15.0g

添加物として ペンザルコニウム塩化物含有

溶剤として精製水

**【保管及び取扱い上の注意】**


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

**【包装】**30g×2個入、5個入、10個入、(パステル)20個入

お問合せ先 ムネ製薬株式会社 お客様相談室

電話番号：0120-85-0107

受付時間：8：30～17：00 (土日祝を除く)

製造販売元  ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎 859

<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
電話：0120-149-931