

鎮痛・消炎冷感 シッコ薬

クールビハラ

COOL BIHARA

腰痛 肩こり
筋肉痛

第3類医薬品

4つの有効成分

- サリチル酸メチル ●dl-カンフル
- l-メントール ●トコフェロール酢酸エステル



保存チャック付

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛・消炎冷感 カルビルラシ

第3類医薬品



【特長】

- 粘着力が強く、皮ふにピッタリ良くつきます。
- 4つの有効成分が、患部に効果をあらわします。
- 皮ふにやさしい弱酸性です。
- 伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

⚠【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]
次の部位には使用しないで下さい。

(1) 眼の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】

表面のフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付して下さい。
必要な時は、包帯又はテープでとめて下さい。

お問い合わせ先:株式会社タカミツ
フリーダイヤル 0120-459533/受付時間 (月～金曜日 9:00～17:00 祝日を除く)

【用法・用量に関する注意】

1. 定められた用法・用量を守って下さい。
2. 体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付して下さい。
3. 本剤に触れた手で、眼、鼻腔、唇等の粘膜に触れないよう注意して下さい。
4. 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督の下に使用させて下さい。

【成分・分量】〈膏体 100g中〉

サリチル酸メチル 1.0g dα -カンフル 0.4g
l -メントール 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.2g

※ 添加物としてエデト酸Na水和物、カオリン、酸化チタン、CMC-Na、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、ヒマシ油、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 使用後は、未使用分を袋に戻し、外気に触れないよう開封口のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
4. 他の容器に入れ替えないで下さい。
[誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。]
5. 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
6. 開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

1枚: 10cm×14cm

製造販売元 **株式会社タカミツ**

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の68の1

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)